

Cukriniai runkeliai



Startinės trąšos

Black Pearl 20-100 kg/ha kartu su sėkla

3 – 5 lapai*
(BBCH 13-15)

Razormin 0,3
Ikar NB+ Mo 0,5-1,0
Nutrivant Plus 1,0-2,0

Aminocat / Fitomare
0,3
Ikar NB+ Mo 0,5-1,0
Nutrivant Plus 1,0-2,0

Ikar NB + Mo 0,5-1,0
Nutrivant Plus 1,0-2,0

7 – 8 lapai*
(BBCH 17-19)

Ikar Kalisto/Ikar
Kalisi 0,5-1,0
Ikar NB+ Mo 0,5-1,0
Nutrivant Plus
1,0-2,0

Raykat Growth 0,5
Ikar NB+ Mo 0,5-1,0
Nutrivant Plus 1,0-2,0

Ikar NB + Mo 0,5-1,0
Nutrivant Plus 1,0-2,0

Susiformavus 50% lapų
(BBCH 17-39)

Ikar Kalisto/Ikar Kalisi
0,5-1,0
Ikar NB+ Mo 0,5-1,0
Nutrivant Plus
1,0-2,0

Raykat Final 0,7-1,0
Ikar NB+ Mo 0,5-1,0
Nutrivant Plus 1,0-2,0

Atlante /Ikar Fosto
0,5-1,0
Ikar NB + Mo 0,5-1,0
Nutrivant Plus 1,0-2,0

30 dienų iki derliaus
nuėmimo*

Florone* 0,5 – 0,7 l
Nutrivant Plus 1,0 - 2,0 kg

Produktų normos nurodytos 1 hektarui.

Florone* * - nemišyti su azotinėmis trąšomis

Sustojus augimui, streso pasekmėms šalinti- Aminocat 0,1-0,3

* Tirpalo parūgštinimui -Tron-pH 50-75 ml/100 litrų vandens. Vanduo keis spalvą, pagal kurią ir nustatysime pH.