

# Golfo aikštyno vejų tręšimas



## Pagrindinis tręšimas ankstį pavasarį

**Vegetacijai prasidėjus**  
**Biocat 15 20 l/ha**  
(laistyti)

**Pradėjus intensyviai augti**  
**N- 30 v.m.**

## Papildomas tręšimas ankstį pavasarį

**Purškimas arba laistymas**  
Atlante 0,5% arba 2,0 l/ha;  
Fitomare 0,3% arba 1,0 l/ha

## Papildomas tręšimas pradėjus intensyviai augti

**Purškimas arba laistymas**  
Razormin 0,3% arba 2,0 l/ha;  
Kelik K-Si 0,3% arba 1,0 l/ha

## Tręšimas, augimo reguliavimas, pradėjus intensyviai augti


**Purškimas arba laistymas**  
Florone 0,2% arba 2,0 l/ha  
Kelik K-Si 0,2% arba 1,0 l/ha

Sezono metu, kas 10-14 dienų, reikėtų purkšti arba laistyti

Razormin 0,3% - 2,0-3,0 l/ha  
Atlante 0,5% - 2,0 -3,0 l/ha  
Microcat Mn Zn 0,5% - 2,0-3,0l/ha  
Atlante Zn 0,5% - 2,0 l/ha  
Kelik K 0,3% - 2,0 l/ha  
Kelik K Si 0,3% - 2,0 l/ha



Norint gauti geresni tręšų efektyvumą, prie purškimų galima dėti Nutrivant Plus Rapsui tręšų 0,2% - 0,2kg/ 100 litrų vandens.



# Sportinės vejos



Pavasarių veją būtina patrešti azoto turinčiomis trąšomis. Po žiemos veja yra nusilpusi ir būtent azoto dėka veja pradės greičiau augti ir taps žalesnė.

Kad vejoje neatsirastų samanų reikia naudoti geležies turinčias trąšas.

Sezono metu, kas 10-14 dienų, reikėtų purkšti arba laistyti

Pagrindinis tręšimas  
Barstymas

**Vegetacijai prasidėjus**  
**Agromaster**  
NPK 25-5-  
10+2MgO+24SO<sub>3</sub>  
300 kg/ha  
(lėtai tirpstančios trąšos)

**Vegetacijos pabaigoje**  
**Agroblen NPK 9-13-**  
18+3MgO 300kg/ha (lėtai  
tirpstančios trąšos)

Papildomas tręšimas  
ankstį pavasarį

**Purškimas arba  
laistymas**  
Atlante 0,5% - 0,5 l/ha  
Razormin 0,3% - 3,0 l/ha


Papildomas tręšimas  
pradėjus intensyviai augti

**Purškimas arba  
laistymas**  
Razormin 0,3 l/ha-3,0 l/ha  
Kelik K-Si 1,0 l/ha

Razormin 0,3% - 2,0-3,0 l/ha  
Atlante 0,5% - 2,0 -3,0 l/ha  
Microcat Mn Zn 0,5% - 2,0-  
3,0l/ha  
Atlante Zn 0,5% - 2,0 l/ha  
Kelik K 0,3% - 2,0 l/ha  
Kelik K Si 0,3% - 2,0 l/ha

Tręšimas, augimo reguliavimas,  
pradėjus intensyviai augti

**Purškimas arba laistymas**  
Florone 0,2-0,3% - 2,0-3,0 l/ha  
Kelik K Si 0,2- 0,3% - 2,0-3,0 l/ha



# Sodybų vejos



Po žiemos veja yra nusilpusi, todėl patrešus azoto turinčiomis trąšomis, veja pradės greičiau augti ir taps žalesnė.

Kad vejoje neatsirastų samanų reikia naudoti geležies turinčias trąšas.

Pagrindinis tręšimas.  
Barstymas

**Vegetacijai  
prasadėjus  
Agromaster**

NPK 25-5-  
10+2MgO+24SO<sub>3</sub>  
300 kg/ha  
(Lėtai tirpstančios  
trąšos)

**Vegetacijos pabaigoje  
Agroblen**NPK 9-13-  
18+3MgO 300kg/ha  
(Lėtai tirpstančios  
trąšos)

Papildomas tręšimas  
anksti pavasarį, padėti vejai  
atsigauti ir geriau isisaknyti.

**Purškimas arba laistymas**  
Atlante 0,5 % - 2,0-3,0 l/ha  
Razormin 0,3% - 2,0 l/ha

Tręšimas, augimo reguliavimas,  
pradėjus intensyviai augti

**Purškimas arba laistymas**  
Florone 0,2-0,3% - 2,0-3,0 l/ha  
Kelik K Si 0,2- 0,3% - 2,0-3,0 l/ha

Rugsėjo mėnesį, norint, kad  
veja geriau peržiemotų

**Purškimas arba laistymas**  
Fitomare 0,5% - 1,0 l/ha  
Atlante 0,5% - 2,0 l/ha

