

Radviliškio raj. ūkininkas L. Radėnas

2014.06.05 d buvo daryta lauko diena su „Litagros“ vadybiniku ir jo kliektais.

Apžiūrėjome ir įvertinome pasėlį.

Bandymų ataskaitų suvestinė

Kultūra	Žieminiai kviečiai	
Šalis/Vietovė	Radviliškis	
Tikslas	Patikrinti „Atlantica“ ir „ICL“ trąšų efektyvumą.	
Bandymo schema	Prie beico.	Raykat Start 0,7 l/t
	Rudeninis purškimas	Microcat Zn Mn 0,3 l/ha
		Nutrivant Plus Javams 1,5 kg.ha
	Pirmas purškimas. BBCH 21-30. Kartu su augimo reguliatoriumi.	Florone 0,15 l/ha
		Razormin 0,2 l/ha
		Nutrivant Plus Javams 1,5 kg.ha
	Antras purškimas. Bamblėjimas. BBCH 32-37. Kartu su fungicidu.	Raykat Growth 0,5 l/ha
		Florone 0,3 l/ha
		Nutrivant Plus Javams 2,0 kg.ha
	Trečias purškimas. Vėliavinis lapas. BBCH 47-59. Kartu su fungicidu.	Raykat Final 0,7 l/ha
Kelik K 0,5 l/ha		
Nutrivant Plus Javams 2,0 kg.ha		
Bandomas produktas	„ICL“ ir „Atlantica“ trąšos.	
Panaudojimo būdas	Papildomas tręšimas purškiant ant lapų.	
Apskaitos	Bendras žieminių kviečių derlius, prieš tai įvertinant pasėlio būklę lauko dienoje.	
Bandymo rezultatai	Papildomai „Atlantica“ ir „ICL“ trąšomis purkšto lauko dalis buvo sveikesnė, augalai atrodė žalesni, tvirtesnė šaknų sistema. Nukūlus gautas 0,5 t/ha papildomas derlius.	

