

## Aviečių tręšimas

Svarbu atsižvelgti į dirvožemio būklę ir augalų išsivystymą. Tręšti pradama trečiaisiais auginimo metais. Patartina tręšti K, Mg, P, N trąšomis.

Avietės jautriai reaguoja į azoto ir kalio trąšas, o mažiausiai – į fosforo. Jaunos avietės (pirmuosius dvejus metus po sodinimo) tręšiamos tik azoto trąšomis – 100-120 kg/ha v.m. (340-400 kg/ha amonio salietros).

Derančioms avietėms azoto trąšų normos, remiantis lapų analizėmis ir priklausomai nuo dirvos derlingumo, yra 70-120 kg/ha v.m. Didelė dalis (apie 2/3 normos) azoto trąšų išberinama anksti pavasarį, o likusi – žydėjimo pradžioje.

- Reikia nevēluoti patręšti, nes jauni stiebai gali nespėti subręsti ir žiemą pašalti, labiau sirgti.
- Remontantinėms avietėms azoto trąšų norma 1/3 didesnė – 90-150 kg/ha v. m.
- Vegetacijos pradžioje avietės tręšiamos karbamidu.
- Gegužės ir birželio mėn. 2-3 kartus avietės tręšiamos amonio salietra.
- Kalio trąšų norma – 120-150 kg/ha v. m.
- Fosforo trąšų norma – 40-60 kg/ha v. m.

