

Darbai braškyne po derliaus nuėmimo

Nuėmus derlių, lapai pjaunami tik ligotuose, kenkėjų apniktuose ir piktžolėtuose braškyuose. Pjaunama tuoj po derliaus nuėmimo, ne žemiau 5 cm virš ragelių. Nupjovus lapus, purenami tarpueiliai ir purškiami herbicidai. Ataugusi nauja lapija profilaktiškai gali būti apdorota ligų plitimą stabdančiais produktais (fungicidais, atsparumą ligoms didinančiomis trąšomis).

Jei iki rugpjūčio mėn. lapai dar nenuėjau, juos geriau palikti, nes sumažės uogų derlius, kereliai bus jautresni nepalankioms žiemėjimo sąlygoms.

Uogoms nokstant, braškių kereliai beveik neauga. Nuėmus derlių, pradeda intensyviai augti nauji lapai, ūsai, šaknys, vėliau ir nauji rageliai. Kereliai vešliai auga nuo liepos vidurio iki rugpjūčio pabaigos. Tada braškes reikia papildomai tręšti ir laistyti. Braškės tręšiamos kompleksinėmis trąšomis (daugiau P ir K) su mikroelementais 400–600 kg/ha ir 1–2 kartus laistomos vandeniu, jei žemė sausa.

Nuskynus derlių augimas sulėtėja ir prasideda žiedinių pumpurų formavimasis, kuris tęsiasi iki vegetacijos pabaigos ir kitą pavasarį. Vėliau pradėjus laistyti ir tręšti, lieka mažiau laiko žiediniams pumpurams susidaryti, todėl kitų metų uogų derlius bus mažesnis.

Piktžolės naikinamos purenant tarpueilius, ravint, mulčiuojant ar purškiant herbicidais. Jauni braškynai purškiami praėjus savaitei po pasodinimo.

Jei buvo tręšta prieš sodinimą, jaunas braškynas papildomai tręšiamas nedaug kompleksinėmis trąšomis (daugiau P ir K) su mikroelementais 200 kg/ha.

Kalio ir fosforo trąšomis prieš įveisimą netręštą braškyną arba augalams trūkstant minėtų elementų, reikia patręšti 30–60 kg/ha P₂O₅ ir 50–80 kg/ha K₂O norma.

Paruošimui žiemai, būsimo derliaus formavimui braškyną rekomenduojama tręšti 2 kartus kas 15 dienų Nutrivant Plus trąšomis be azoto (Nutrivant Plus Bulvėms) 3 kg/ha + Kelik K 1,0 l/ha + Atlante 0,5 l/ha + Florone 0,15 l/ha.

Maistinių elementų poreikis skirtingais braškių augimo tarpsniais

